

*Informació per a pacients***Dacriografia****Què és?**

És l'exploració radiològica que serveix per estudiar el sac i el conducte lacrimal mitjançant contrast iodat.

Important per a la vostra seguretat!**Abans de fer la prova informeu-nos si:**

- Heu tingut alguna al·lèrgia o reacció adversa al contrast en alguna ocasió anterior.
- Esteu embarassada o sospiteu que ho podeu estar.

Abans de la prova

Aquesta prova no requereix cap preparació prèvia.

Durant la prova

- En arribar, us haureu de retirar les joies i objectes metàl·lics que porteu al cap.
- Us haureu de situar sobre la taula de RX. Primer es realitzarà una radiografia simple, i després es procedirà a la neteja i desinfecció de l'ull amb un antisèptic.
- A continuació, el metge radiòleg col·locarà un petit catèter a la papil·la lacrimal i injectarà contrast iodat,

mentre es realitzen diverses radiografies del sac i del conducte lacrimal.

- En finalitzar la prova, es retirarà el catèter i es netejarà l'ull amb sèrum fisiològic.

Després de la prova

Poden aparèixer alguns efectes secundaris a causa de l'administració del contrast:

- Insensibilitat temporal a la còrnia.
- Sensació gustativa oliosa durant uns minuts.
- Molèsties per la dilatació del punt lacrimal i la canalització del conducte.
- Pressió en el costat del nas, per l'ompliment del sac lacrimal amb el contrast.

Aquestes molèsties són temporals i solen desaparèixer en 10 - 15 minuts.

Recomanacions

- Protegiu-vos els ulls amb ulleres de sol o de vista.
- Eviteu tocar i rascar l'ull al qual s'ha fet la prova.
- Eixugueu el lacrimal amb una gasa, fent petits tocs, sense refregar-lo.