

Informació per a pacients i familiars

Tractament antiretroviral en règim d'acció prolongada



El tractament antiretroviral (ARV) en règim d'acció prolongada és la combinació de Cabotegravir i Rilpivirina injectable pel tractament de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana tipus-1 (VIH-1).

Programació de visites

Us facilitarem la programació de les visites per a l'administració de les injeccions. El tractament, sempre que sigui possible, es posarà el mateix dia de cada mes. La data s'establirà segons el dia que us posem la primera injecció, entre el dia 1 i 28 per tal de garantir la continuïtat del tractament en els mesos més curts.

Important

Si no podeu assistir a la visita, ho heu de comunicar com més aviat possible.

- **Cristina Lao:** 692 97 82 38
- **Hospital de Dia:** 93 875 93 00 - Ext. 3830

Consells per al dia de l'administració del tractament

- Després de les injeccions **podeu prendre analgèsics** que no necessitin recepta
- Si noteu dolor, podeu aplicar **fred a la zona de la injecció** per tal de reduir-lo
- **És recomanable que us mantingueu actius**, evitant estar assegut durant llargs períodes de temps. Eviteu l'exercici extenuant

Reaccions adverses

- Sentir adolorida o rígida la zona de la injecció
- Inflor i envermelliment a la zona de la injecció

La majoria de reaccions són lleus o moderades i milloren per sí soles al cap d'uns dies, generalment 3.

L'interval de dies assignat pel dia de la injecció **no es pot variar**, pel risc d'aparició de resistències al fàrmac.