

*Informació per a pacients*

## **Preparació per a la biòpsia de pròstata**



La biòpsia de pròstata consisteix a obtenir mostres de la zona de la pròstata en la qual s'ha observat una alteració.

Per fer la prova se us col·locarà una cànula al recte a través de la qual s'introduirà una agulla per fer la biòpsia. L'agulla es guiarà fins a la zona sospitosa mitjançant les imatges que ofereix la ressonància magnètica (RM) o l'ecografia. La tècnica d'elecció dependrà de cada cas particular.

### **Preparació per a la biòpsia**

Heu de tenir una analítica amb les proves de coagulació que probablement el vostre uròleg ja us ha sol·licitat.

Si preneu Sintrom®, altres anticoagulants, aspirina o similars, heu de consultar al vostre especialista o metge de capçalera per saber quants dies abans heu de deixar de prendre'l i quina pauta de medicació alternativa us recomana.

### **Dia de la prova**

- A primera hora del matí us haureu d'administrar un **ènema Casen al que afegireu 10 ml de Iode aquós** (Curadona® o Betadine® en unidosi).
- **Profilaxi antibiòtica:** Heu de prendre **Fosfomicina Trometalol 3 g oral, 2 hores abans** del procediment.
- Heu d'estar **6 hores en dejú i podeu beure aigua fins a 2 hores abans** de la biòpsia.
- És convenient que vingueu amb roba fàcil de posar i treure i complir amb les normes mínimes d'higiene.

### **Dia després de la prova**

A les 24 hores, heu de repetir una **2a dosi de Fosfomicina Trometalol 3 g oral**.

### **Riscos generals**

- Com que el procediment necessita extreure trossos de teixit de la pròstata, és possible que aparegui un hematoma pel sagnat de la zona on s'ha fet la biòpsia.

- Com en tota punció, existeix un petit risc d'infecció, és per aquest motiu que us heu de prendre l'antibiòtic.
- Podeu tenir una reacció al·lèrgica als medicaments i als utensilis que s'utilitzen per fer la biòpsia. Si és així, ens ho heu d'indicar abans de fer la biòpsia.
- En el cas que la biòpsia es realitzi per ressonància magnètica, l'única contraindicació al procediment és que porteu algun element en el cos que no us el pugueu treure i no pugueu entrar a l'aparell de ressonància. L'altra contraindicació seria l'existència d'alteracions en la coagulació.

Si teniu qualsevol dubte o problema **contacteu amb nosaltres.**



Dies feiners de **07:15 h a 20:30 h**



**93 875 93 00** (extensió 5061 - 5063)

Per a més informació podeu descarregar-vos l'APP d'Althaia al vostre mòbil

